

Пластырь "Майгуаньнь" от васкулита и варикозного расширения вен применяется для терапии варикозного расширения сосудов и васкулита.

Пластыри изготовлены с использованием древнейшей технология, суть которой сводиться к тому, что лекарственные компоненты с высокой проникающей способностью моментально впитывается в ткани через поры кожи и содействует восстановлению стенок кровеносных сосудов, рассасыванию тромбов. Так-же нормализуется работоспособность артериального клапана, позволяющая усилить отток крови к нижним конечностям и насытить ткани активным кислородом.

Состав: корень шалфея краснокорневищного (даньшэнь), корневище и корень нотоптеригиума (цянхо), кора бархатного дерева (хуанбай), корневище атрактилодеса ланцетного (цан чжу), лист полыни Арги (ай е), корневище куркумы длинной (цзян хуан), смола босвеллии Картера (жу сян), смола коммифоры мирра (бальзамового дерева) (мо яо), высушенное тело пиявки японской (шуй чжи), мускус (шэ сян), борнеол (бин пянь), сороконожка (угун) и др.

Область применения:

1. Венозные отеки различной этиологии и отеки мягких тканей, долго не проходящий и тяжело протекающий васкулит.
2. Нарушение кровообращения в ногах, хронические и острые заболевания сосудов, варикозное расширение вен, а также прочие болезни нижних конечностей, вызванные варикозным расширением и сопровождающиеся отеком, зудом, усталостью, болезненностью, чувством тяжести, появлением язв, воспалительными процессами и проч.
3. Артериальный и венозный тромбоз.

Способ применения:

- при варикозном расширении пластырь следует накладывать на болезненные места;
- при тромбозе сосудов в икроножной области сначала произвести массаж ног в направлении снизу вверх, нащупывая нитевидные уплотнения и узелки (то есть места возможного образования тромбов), затем на эти участки наложить пластырь;
- при генерализированном отеке ног пластырь следует наклеивать на паховую область

или бедро.

Если на коже есть повреждения или открытые раны, то пластырь необходимо наклеивать на некотором расстоянии от пораженного участка (около 1 см). На поврежденную область кожи пластырь наклеивать не разрешается.

Накладывать пластырь на 48 часов, курс 10 дней, рекомендуется повторить 2-3 курса.