Действие: препарат применяется для сокращения/сужения местных капилляров с целью сокращения местного кровоснабжения, предупреждает распространение воспалений, предотвращает застой крови, отёк, инфильтрацию (проницаемость) клеток и прочие болезненные образования. Кроме того, используется для усиления действия антибиотиков.

Состав: фтористая кислота, салициловая кислота, борнеол и др. Фтористая кислота, входящая в состав, представлена в слабой концентрации, необходимой для подавления воспалений. Входящая в состав салициловая кислота обладает разъедающим кожу свойством, применяется для уничтожения грибка. Борнеол используется в качестве местной анестезии и как антисептик.

Описание: прозрачная жидкость жёлтого цвета с лёгким красноватым оттенком.

Показание: препарат рекомендован при местных кожных раздражениях, при повышенном шелушении кожи.

Способ применения и дозы: наружно. Наносить на поражённые участки 2 раза в день, утром и вечером.

Внимание: следует с большой осмотрительностью отнестись к применению данного препарата во время беременности и в период кормления грудью. Препарат нельзя наносить на область вокруг глаз, а так же на чувствительную кожу подмышечных впадин, область паха и проч. При возникновении раздражения на коже следует немедленно прекратить использование данного препарата. Препарат не подходит для длительного лечения, а также для применения на обширных зонах. Пожалуйста, храните препарат в недоступном для детей месте. Препарат не подходит для лечения младенцев и детей младшего возраста.

Взаимодействие с другими препаратами: осложнений при совместном применении с другими препаратами не выявлено.

Внимание! Препарат пригоден только для наружного применения!

Условия хранения: хранить в сухом, тёмном, прохладном месте.